

**Prospect: informații pentru utilizator****Locoid Lipocream 1 mg/g cremă**

Butirat de hidrocortizonă

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct.4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Locoid Lipocream și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Locoid Lipocream
3. Cum să utilizați Locoid Lipocream
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Locoid Lipocream
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Locoid Lipocream și pentru ce se utilizează**

Locoid Lipocream conține un corticosteroid (hidrocortizon-17-butirat) care ameliorează rapid simptome cum sunt pruritul, roșeața și descuamarea pielii, care apar în unele afecțiuni ale pielii. În general, corticosteroizii nu vindecă boala de fond.

Locoid Lipocream poate fi utilizat în tratamentul afecțiunilor superficiale ale pielii, în care mâncărimea, roșeața și descuamarea sunt frecvente.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Locoid Lipocream****Nu utilizați Locoid Lipocream**

- dacă sunteți alergic la butirat de hidrocortizonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament(enumerate la punctul 6);
- dacă aveți:
  - afecțiuni ale pielii produse de infecții bacteriene, virale, fungice sau parazitare (acestea se pot agrava sau pot fi mascate)
  - acnee, inclusiv acnee rozacee
  - răni, ihtioză
  - afecțiuni ale pielii rezultate în urma unui tratament anterior cu corticosteroizi, cum sunt inflamația pielii în jurul gurii, piele subțiată, cu vergeturi și fragilitate vasculară

**Atenționări și precauții**

Locoid Lipocream nu trebuie să ajungă în contact cu ochii sau cu pleoapele. Pielea feței și în special pliurile cutanate sunt foarte sensibile la corticosteroizi și de aceea necesită multă atenție.

Dacă după un tratament de lungă durată, afecțiunea re apare rapid, trebuie să vă adresați medicului.

De asemenea, examinarea de către medic este necesară dacă este utilizat pe zone întinse ale pielii. Dacă apar fenomene de intoleranță locală tratamentul trebuie întrerupt și trebuie investigată cauza. Absorbția corticosteroizilor poate fi crescută semnificativ în cazul aplicării pe suprafețe întinse, mai ales la nivelul pliurilor și în cazul aplicării de pansament (plastic) ocluziv, ducând la supresia funcției adrenale la nivel central.

În caz de suprainfecție bacteriană sau micotică a unei dermatoze corticosensibile, tratamentul glucocorticoid trebuie precedat de tratament specific sau în cazuri excepționale se utilizează tratament specific asociat cu glucocorticoizi.

### **Copii și adolescenți**

De asemenea, examinarea de către medic este necesară dacă este utilizat la copii. La copii, trebuie evitată prelungirea tratamentului cu corticosteroizi

Absorbția corticosteroizilor poate fi crescută semnificativ în cazul aplicării pe suprafețe întinse, mai ales la nivelul pliurilor și în cazul aplicării de pansament (plastic) ocluziv, ducând la supresia funcției adrenale la nivel central. Aceasta poate apare relativ rapid la copii, și poate duce la supresia secreției hormonilor de creștere.

### **Locoid Lipocream împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament

Trebuie să întrebați medicul dacă vreți să utilizați Locoid Lipocream în timpul sarcinii și alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu există date în ceea ce privește efectele Locoid Lipocream asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje, dar se pare că nu are nici o influență asupra acestora

### **Locoid conține parahidroxibenzoat de propil (E 216).**

Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

## **3. Cum să utilizați Locoid Lipocream**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Locoid Lipocream trebuie aplicat în strat subțire pe porțiunea de piele afectată. După aplicare, se masează ușor pielea pentru a facilita pătrunderea Locoid Lipocream. Nu aplicați de mai mult de 1-3 ori pe zi pe pielea afectată, cu excepția cazurilor în care medicul v-a recomandat altfel.

Dacă simptomele se ameliorează, medicul vă poate sfătui să reduceți numărul de aplicații zilnice. În general, nu trebuie să utilizați mai mult de 1-2 flacoane Locoid Lipocream de 30 g pe săptămână.

### **Dacă utilizați mai mult Locoid Lipocream decât trebuie**

Dacă, accidental, înghițiți Locoid Lipocream, adresați-vă medicului sau farmacistului cât mai curând posibil. Nu încercați să vă provocați vărsături.

### **Dacă uitați să utilizați Locoid Lipocream**

Dacă ați uitat să aplicați Locoid Lipocream la momentul recomandat, aplicați-l imediat ce vă reamintiți, apoi continuați conform schemei de aplicare recomandate.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Se poate întâmpla să remarcăți o ușoară senzație de arsură sau de uscăciune a pielii după aplicarea de Locoid Lipocream. Aceste manifestări nu sunt grave și dispar de la sine. Dacă folosiți mult timp corticoizi, pot să apară erupții pe piele și acnee (coșuri). Pielea se poate decolora sau subția și uneori apar vergeturi. Dacă apar aceste reacții adverse, informați-vă medicul.

Poate apare reacție de hipersensibilizare, subțierea pielii - adesea ireversibilă, dilatarea vaselor mici de sânge (în special la nivelul feței), fragilitate cutanată, purpură echimotică secundară subțierii pielii.

- întârzierea procesului de cicatrizare al rănilor, ulcerațiilor la nivelul pielii, al rănilor la nivelul gambelor.
- la nivelul feței, glucocorticoizii pot determina dermatită în jurul gurii și pot agrava rozaceea (o boală de piele care afectează fața).
- la nivel ocular: pot crește presiunea intraoculară, risc de opacizare a cristalinului.

Au mai fost raportate: hipertricoză, alergii de contact, erupții pustuloase sau acneiforme.

Incidența reacțiilor adverse locale crește cu concentrația produsului și durata tratamentului. Aplicarea sub pansament ocluziv (plastic, pliuri cutanate) crește riscul reacțiilor adverse.

Dacă medicamentul nu este folosit corespunzător poate masca/agrava infecțiile bacteriene, parazitare, fungice și virale.

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Locoid Lipocream**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri ajută la protejerea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Locoid Lipocream**

- Substanța activă este butirat de hidrocortizonă. Fiecare gram cremă conține butirat de hidrocortizonă 1 mg.
- Celelalte componente sunt: alcool cetostearilic, macrogol 25 cetostearil eter, parafină lichidă ușoară, vaselină albă, parahidroxibenzoat de propil (E 216), parahidroxibenzoat butil, alcool benzilic acid citric anhidru, citrat de sodiu anhidru, apă purificată.

##### **Cum arată Locoid Lipocream și conținutul ambalajului**

Locoid Lipocream se prezintă sub formă de cremă de culoare albă.

Cutie cu un flacon din aluminiu, închis cu capac cu filet din polipropilenă; conține 30 g cremă.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**  
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH  
Ziegelhof 24, 17489 Greiswald, Germania

**Fabricantul**  
TEMMLER ITALIA S.R.L.  
Via Delle Industrie 2  
20061 Carugate (MI), Italia

**Acest prospect a fost revizuit în Iunie, 2021.**