

Prospect: Informații pentru utilizator**Troxerutin Fiterman 20 mg/g gel**
troxerutin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Troxerutin Fiterman și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Troxerutin Fiterman
3. Cum să utilizați Troxerutin Fiterman
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Troxerutin Fiterman
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Troxerutin Fiterman și pentru ce se utilizează

Troxerutin Fiterman este un produs ce face parte din grupa farmacoterapeutică a vasoprotectoarelor, medicația capilarelor (capilarotonice), bioflavonoide.

Troxerutin Fiterman se utilizează pentru tratamentul insuficienței venoase cronice, tromboflebitei superficiale, sindromului posttromboflebitic, hemoroizilor, tratamentul profilactic și curativ al varicelor, tratamentul durerii postfleboscleroză, tulburărilor circulației sanguine periferice (fragilitate capilară, hematoame), edemelor și durerii de origine traumatică.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Troxerutin Fiterman**Nu utilizați Troxerutin Fiterman**

- dacă sunteți alergic la troxerutin, la alte rutozide sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Troxerutin Fiterman, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Nu aplicați gelul dacă la nivelul pielii există răni deschise.

Troxerutin Fiterman împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Troxerutin Fiterman nu interacționează cu alte medicamente utilizate concomitent.

Sarcina alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Ca măsură de precauție, în timpul primului trimestru de sarcină și al alăptării, Troxerutin Fiterman va fi utilizat numai la recomandarea medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Troxerutin Fiterman nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Troxerutin Fiterman conține propilenglicol, care poate provoca iritație cutanată.

Troxerutin Fiterman conține p-hidroxibenzoat de metil (E 218) și p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216), care pot provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. Cum să utilizați Troxerutin Fiterman

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicamentul se aplică de două ori pe zi masând ușor până ce pătrunde în piele. Dacă este necesar, puteți aplica Troxerutin Fiterman sub bandaje ocluzive sau ciorapi cu compresie gradată.

Dacă utilizați mai mult Troxerutin Fiterman

În general, Troxerutin Fiterman este bine tolerat, chiar dacă ați depășit doza recomandată. Cu toate acestea, în acest caz adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Troxerutin Fiterman

Dacă ați uitat să aplicați o doză, aplicați alta, imediat ce v-ați amintit. Nu aplicați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Troxerutin Fiterman

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Troxerutin Fiterman poate determina reacții adverse locale, cum sunt, în cazuri rare, reacții cutanate de hipersensibilizare (de exemplu, înroșirea pielii).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare,

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,

str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1,

București 011478- RO,

tel: + 4 0757 117 259,

fax: +4 0213 163 497,

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Troxerutin Fiterman

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Troxerutin Fiterman

- Substanța activă este troxerutin. Fiecare gram de gel conține 20 mg troxerutin.
- Celelalte componente sunt: carbomer 980, propilenglicol, trietanolamină, glicerol, etanol, p-hidroxibenzoat de metil (E218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E216), apă purificată.

Cum arată Troxerutin Fiterman și conținutul ambalajului

Troxerutin Fiterman se prezintă sub formă de gel cu aspect transparent, de culoare galbenă, cu miros caracteristic de alcool.

Troxerutin Fiterman este disponibil în cutie cu un tub din aluminiu a 25 g sau 45 g gel.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Fiterman Pharma S.R.L.
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, România

Fabricantul

Fiterman Pharma S.R.L.
DJ 249E Km 0900, sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, România

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2020.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>