

**Prospect: Informații pentru utilizator****Nettacin 3 mg/g unguent oftalmic**  
Netilmicină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Nettacin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nettacin
3. Cum să utilizați Nettacin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Nettacin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Nettacin și pentru ce se utilizează**

Nettacin este un medicament cu aplicare la nivelul ochilor. Nettacin conține ca substanță activă netilmicină care face parte dintr-o clasă de medicamente numite antibiotice aminoglicozidice. Netilmicina este un antibiotic aminoglicozidic semisintetic, cu spectru larg.

Este utilizat în tratamentul local al infecțiilor externe ale globului ocular și ale anexelor, cauzate de germeni sensibili la netilmicină.

Acest medicament este indicat la adulți. La copii și adolescenți produsul trebuie folosit numai dacă este absolut necesar și sub supraveghere medicală atentă.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Nettacin****Nu utilizați Nettacin:**

- dacă sunteți alergic la netilmicină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la orice alte medicamente antibiotice aminoglicozidice.
- În timpul alăptării.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Nettacin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

- dacă utilizați Nettacin pe perioade lungi de timp (administrarea locală prelungită a antibioticelor poate determina proliferarea bacterilor rezistente sau suprainfectarea cu ciuperci).
- dacă observați că boala dumneavoastră nu se ameliorează după un timp relativ scurt sau dacă apar fenomene alergice la componentele medicamentului, tratamentul trebuie întrerupt și se va consulta medicul pentru prescrierea unei terapii adecvate.

### **Nettacin împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

În special spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați:

- alte antibiotice din clasa aminoglicozidelor (nu se recomandă administrarea concomitentă cu alte antibiotice aminoglicozide);
- alte antibiotice precum polimixine, cefalotină, ;
- medicamente care elimină apa din organism precum furosemid și acid etacrinic;
- medicamente împotriva ciupercilor precum amfotericina B;
- medicamente care scad imunitatea precum ciclosporină;
- medicamente pentru cancer precum cisplatină;
- alte medicamente care afectează rinichii și aparatul auditiv;
- antibiotice din clasa beta-lactamice (deoarece antibioticele aminoglicozidice și antibiotice beta-lactamice se inactivează reciproc).

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea Nettacin în timpul sarcinii se va face numai dacă este absolut necesar și după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potențial fetal.

Siguranța Nettacin în timpul alăptării nu a fost studiată, astfel că utilizarea sa nu este recomandată în acest caz.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nettacin nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Nettacin conține lanolină.**

Aceasta poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

## **3. Cum să utilizați Nettacin**

Utilizați întotdeauna Nettacin exact cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

### *Adulți*

Aplicați o jumătate de centimetru până la un centimetru de unguent în sacul conjunctival de 3–4 ori pe zi.

În cazul administrării concomitente de soluție oftalmică cu netilmicină, este suficientă o singură administrare în timpul nopții.

Dacă se administrează mai mult de un medicament cu administrare locală la nivelul ochilor, celelalte medicamente trebuie administrate separat la un interval de cinci până la zece minute.

### **Utilizarea la copii**

La copii și adolescenți produsul trebuie folosit numai dacă este absolut necesar și sub supraveghere medicală atentă.

#### *Reguli de administrare*

Lăsați capul pe spate, trageți ușor de pleoapa inferioară, uitați-vă în sus și administrați unguentul în sacul conjunctival (spațiul dintre ochi și pleoapă). Închideți ochii ușor și rămâneți cu ei închiși pentru câteva secunde.

#### *Recomandări pentru utilizarea unguentului*

- Nu se administrează medicamentul din același tub mai multor persoane.
- Medicamentul va fi administrat în condiții de igienă maximă: spălați mâinile și nu atingeți vârful aplicatorului de alte obiecte sau suprafețe (inclusiv ochiul).
- Tubul trebuie închis după fiecare administrare.

### **Dacă utilizați mai mult Nettacin decât trebuie**

Dacă v-ați administrat prea mult din acest medicament în ochi, clătiți-vă cu apă caldă. Nu vă administrați unguent până la ora la care trebuie să vă administrați următoarea doză.

### **Dacă uitați să utilizați Nettacin**

Dacă ați uitat să vă administrați Nettacin, aplicați unguentul imediat ce v-ați amintit, apoi continuați administrarea conform recomandării medicului. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt prezentate conform frecvenței de apariție folosind următoarea convenție:

Foarte frecvente	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută	care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele:

Reacții adverse mai puțin frecvente: fenomene de intoleranță și sensibilizare precum roșeață locală, senzație de arsură și mâncărime.

Dacă în timpul tratamentului apar fenomene de iritație la locul aplicării sau reacții alergice tratamentul trebuie întrerupt.

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Nettacin**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.  
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentul ambalat pentru comercializare: 2 ani

Medicamentul după prima deschidere a tubului: 28 zile.

Medicamentul ambalat pentru comercializare: La temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Medicamentul după prima deschidere a tubului: La temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Nettacin**

- Substanța activă este netilmicină. Un gram unguent oftalmic conține netilmicină 3 mg, sub formă de sulfat de netilmicină.
- Celelalte componente sunt: parafină lichidă, lanolină, apă purificată, vaselină albă.

### **Cum arată Nettacin și conținutul ambalajului**

Nettacin se prezintă sub formă de unguent omogen de culoare galben-deschis.

Medicamentul este disponibil în cutie cu un tub din Al prevăzut cu aplicator, cu 5 g unguent oftalmic.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

SIFI S.p.A.  
Via Ercole Patti, 36  
95025 Aci S. Antonio (CT), Italia

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

OFTAFARMA ROMANIA SRL, str. Carol Davila nr. 105-107, et.2, ap. 5, sector 5, București, România

Telefon: 021.314.28.95

Fax: 021.314.28.94

E-mail: [office@sifi.ro](mailto:office@sifi.ro)

**Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2018.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>