

MUPIROCIN SPRAY NAZAL 10ml.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe sa utilizati Mupirocin spray. Daca aveti nelamuriri sau daca aveți nevoie de mai multe informatii sau sfaturi, adresati-va medicului dumneavoastra sau farmacistului.

Acest prospect este in scop informativ, produsul este preparat in Laboratorul Farmaciei Tei Rahova, de catre specialisti in domeniul elaborarilor.

Compozitie: Mupirocina Calcica 1%, apa distilata, PEG400, Propilenglicol, polisorbat, ulei mineral, ulei ricin, glicerina, caprilic, triglyceride, sucrose laurate, sucrose stearate, etoxidiglicol, lecitina, propanediol, hidroxietilceluloza, carbopol, nipagin, nipasol.

Preparatul se prezinta sub forma de suspensie de culoare alba.

Introducere: Mupirocin spray este un agent antibacterian topic, activ fata de microorganismele responsabile de anumite infectii ale pielii sau intranasale, sensibile la mupirocina : ex. Staphylococcus aureus, inclusiv tulpinile meticilino-rezistente, alti stafilococi si streptococi sensibili la Mupirocina, in urma antibiogrammei efectuate in prealabil. De asemenea, poate fi activ fata de germenii gramnegativi, cum sunt Escherichia coli si Haemophilus influenzae prezente la nivelul mucoasei nazale.

Absorbtie si excretie: Mupirocin spray are actiune locala, cu o absorbtie sistematica foarte redusa. Mupirocin spray este rapid metabolizat la metabolitul sau inactiv, acidul monic, si este rapid excretat pe calea renala.

Dozaj si mod de administrare: Adulti si copii: Mupirocin spray se aplica INTRANAZAL de doua ori pe zi, timp de 5-10 zile in functie de recomandarea medicala.

Contraindicatii: Hipersensibilitate la Mupirocina sau alte componente pe care le contine mentionate la componzitie.

Precautii: Aceasta formula de Mupirocin spray nu este indicata decat pentru aplicare locala intranasala. Mupirocin spray nu se aplică pe mucoasana nazala lezata. Mupirocina trebuie folosit cu prudenta in afectiuni renale moderate sau severe.

Folosirea in cursul sarcinii: Studii pe animale de laborator nu au evideniat efecte teratogene. Totusi, NU exista date clare privind siguranta administrarii de Mupirocina in cursul sarcinii. A nu se folosi decat cu recomandare medicala in cursul sarcinii sau alaptarii!

Reactii adverse: Studiile clinice au relevat unele reactii adverse minore limitate la locul aplicarii, cum ar fi: senzatie de arsura, usturime si prurit.

Forma de prezentare: flacon sticla bruna, prevazut cu pulverizator; contine 10ml suspensie.

Conditii de pastrare: Se pastreaza la frigidere intre 2-8 grade Celsius. Dupa deschidere a se pastra la loc racoros (sub 25 grade Celsius) ferit de lumina. A nu se lasa la indemana copiilor, solutia ramasa la sfarsitul perioadei de tratament se arunca.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe sa utilizati Mupirocin spray. Daca aveti nelamuriri sau daca aveti nevoie de mai multe informatii sau sfaturi, adresati-va medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest prospect este in scop informativ, produsul este preparat in Laboratorul Farmaciei Tei Rahova de catre specialisti in domeniul elaborarilor.