

**Compoziție:**

Minoxidil 2%, apa distilata, alcool denaturant, acid lactic, propilen glycol, polisorbitat 20, cocamidopropilamina oxid, dietil ftalat, clorura de benzalconiu, benzoate de denatonium, BHT.

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest preparat, Produsul este facut în laboratorul Farmaciei Tei de catre o echipa de specialist in domeniu. Daca aveti nelamuriri sau neintelegeri referitor la acest prospect, va rugam sa consultati medicul dumneavoastra sau farmacistul.**

**Acest prospect este in scop informativ, (acest preparat se poate ajusta, modifica) in caz ca aveti o reteta magistrala prescrisa de medic.**

Utilizați întotdeauna acest preparat conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect și care pot apărea.

**Ce este Minoxom 20 mg/ml și pentru ce se utilizează.**

Acest preparat se prezintă sub forma unei soluții care se transforma în spuma cu ajutorul pompei spumante pentru aplicare cutanată. Este indicat în cazul căderii moderate a părului (alopecie androgenică) la adulți, bărbați sau femei (Pentru utilizarea de către femei este obligatoriu avizul medicului). Favorizează creșterea părului și stabilizează fenomenul de cădere a părului.

**Nu utilizați preparatul Minoxom 20 mg/ml:**

- dacă sunteți alergic la minoxidil sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui preparat enumerate la Compoziție.

**DACĂ AVEȚI ORICE ÎNTREBĂRI, TREBUIE SĂ CONSULTAȚI MEDICUL DUMNEAVOASTRĂ SAU FARMACISTUL.**

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați preparatul Minoxom 20 mg/ml, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În cazul bolilor cardiace, chiar dacă acestea sunt mai vechi, trebuie să vă adresați medicului înainte de prima utilizare.

**Nu aplicați Minoxom:**

- Dacă nu aveți antecedente familiale de cădere a părului, căderea părului este subită și/sau neuniformă, căderea părului este un efect al nașterii sau cauzele căderii părului sunt necunoscute. În aceste cazuri, consultați medicul înainte de a folosi acest medicament deoarece s-ar putea ca tratamentul să nu fie eficient în aceste tipuri de cădere a părului.
- Pe orice altă parte a corpului
- Dacă scalpul este roșu, inflammat, infectat, iritat sau dureros, dacă prezintă o roșeață sau o inflamație persistentă sau este sensibil la atingere. Preparatul trebuie aplicat doar pe un scalp sănătos.
- Nu aplicați acest preparat în același timp cu alte medicamente dermatologice pentru scalp.

**Trebuie să întrerupeți tratamentul imediat și să consultați un medic:**

- dacă aveți tensiunea mică, durere în piept, ritm cardiac accelerat,
- în caz de leșin sau amețală,
- în caz de creștere în greutate neexplicată, mâini sau picioare umflate (edem),
- în caz de persistență a roșeții sau a iritației scalpului

Este important să se respecte dozele și modul de administrare recomandate: nu creșteți doza și nici frecvența

aplicațiilor.

Nerespectarea dozei și/sau a metodei de administrare recomandate poate conduce la creșterea cantității de minoxidil care ajunge în circulația sanguină și poate determina apariția reacțiilor adverse descrise mai sus. În cazul apariției oricăror simptome descrise mai sus: opriți tratamentul și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Precauții pentru utilizare:

- În cazul contactului accidental cu ochii, cu o plagă, cu o mucoasă, soluția cutanată (conținând alcool etilic) poate determina o senzație de arsură sau de iritație; se recomandă clătirea cu apă rece din abundență.
- A nu se expune la soare pielea capului după tratament; este necesară o măsură de protecție (de exemplu pălărie, șapcă).
- A nu se înghiți. Ingestia accidentală poate determina reacții adverse datorate acțiunii la nivel cardiovascular a minoxidilului. *SE RECOMANDĂ CONSULT MEDICAL DE URGENȚĂ.*
- A nu se inhala.

### **Minoxom 20 mg/ml împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu aplicați acest medicament în același timp cu alte produse dermatologice precum tretinoin, antralin sau betametazonă dipropionat deoarece aceste produse pot să modifice cantitatea de minoxidil care ajunge în fluxul sanguin.

Minoxom spuma este contraindicat femeilor gravide, femeilor care alăptează.

**Minoxom 20 mg/ml conține propilenglicol și poate cauza iritația pielii.**

### **3. Cum să utilizați Minoxom 20 mg/ml**

A nu se utiliza decât de către persoane adulte.

Utilizați întotdeauna acest preparat exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul

sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### **Doza**

Doza uzuală este de o aplicație de două ori pe zi, o doză de un ml spuma cutanată la nivelul pielii capului, luând ca punct de plecare centrul zonei care trebuie tratată.

Doza zilnică nu trebuie să depășească 2 aplicari pe zi, indiferent care este mărimea zonei de tratat.

Întindeți soluția cutanată cu vârful degetelor, pentru a acoperi întreaga zonă de tratat.

Înainte de aplicarea soluției cutanate, spălați-vă pe mâini cu atenție.

Aplicați soluția cutanată pe părul și pe pielea capului perfect uscate.

Administrare cutanată.

Utilizare externă.

#### **Mod de aplicare:**

În funcție de sistemul de aplicare utilizat: spuma

Debutul și intensitatea răspunsului la tratament variază în funcție de fiecare pacient.

Rezultatul nu este imediat: oprirea căderii părului și/sau creșterea acestuia nu apare decât după o perioadă de

timp de la începutul tratamentului (aproximativ 3 sau 4 luni).

#### **Reacții adverse**

Foarte frecvente: Dureri de cap

Frecvente: Depresie, dispnee, hipertricoza, dermatita.

Reacții locale la locul de aplicare: iritație, exfolierea pielii, dermatită, eritem, piele uscată, prurit edem periferic.

### **Câteva informații suplimentare**

La începutul tratamentului, pe o perioadă scurtă, este posibil să se accentueze căderea părului. Este vorba de

firele care trebuiau să cadă și ca urmare a tratamentului cad rapid. Este un fenomen normal, continuați tratamentul.

Primele fire care vor crește vor fi pufoase și puțin vizibile. Cu trecerea timpului, urmând tratamentul, se vor

putea schimba și îndesi.