

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe sa utilizati Mupirocin unguent. Daca aveti nelamuriri sau daca aveti nevoie de mai multe informatii sau sfaturi, adresati-va medicului dumneavostra sau farmacistului.

Acest prospect este in scop informativ, produsul este preparat in Laboratorul Farmaciei Tei Biharia Strada Biharia nr. 67-77, sect. 1, de catre specialisti in domeniul elaborarilor.

Compozitie:

Mupirocin 2% si excipienti: apa, ulei ricin, alc. cetostearilic, cetearil olivat, sorbitan olivat, polisorbat, PEG, lipozomi, alc. cetilic, sucragel, ulei mineral, nipagin, nipasol, guma xantan, etoxidiglicol,

Introducere:

Mupirocin unguent este un agent antibacterian topic, activ fata de microorganismele responsabile de anumite infectii cutanate si intranazale sensibile la mupirocina: ex. Staphylococcus aureus, inclusiv tulpinile meticilino-rezistente, alti stafilococi si streptococi sensibili la Mupirocina in urma antibiogramei efectuate in prealabil. De asemenea, poate fi activ fata de germenii grammnegativi, cum sunt Escherichia coli si Haemophilus influenzae.

Absorbtie si excretie: Mupirocinunguent penetreaza pielea umana intacta, dar rata absorbtiei sistemice pare sa fie joasa. Absorbit sistemic, Mupirocin unguent este rapid metabolizat la metabolitul sau inactiv, acidul monic, si este rapid excretat pe cale renala.

Dozaj si mod de administrare:

Adulti si copii: Mupirocin unguent se aplica pe zona afectata de trei ori pe zi, timp de 5-10 zile in functie de recomandarea medicala.

Contraindicatii:

Hipersensibilitate la Mupirocina sau alte componente pe care le contine baza de unguent (ulei perafina, propilen glicol, polisorbat, vaselinum album, adeps lanae, nipagin, nipasol, etoxidiglicol, polietilenglicol)

Precautii:

Aceasta formula de Mupirocin unguent nu este indicata pentru uz oftalmic, produsul se poate folosi doar intranasal sau cutanat. Cand Mupirocin unguent se aplica pe fata, trebuie evitat contactul cu ochii. Propilen glicolul poate fi absorbit la nivelul plagilor deschise sau al pielii lezate si este excretat pe cale renala. Ca si in cazul altor unguente care au in componetie propilen glicol, Mupirocin unguent trebuie folosit cu prudinta in afectiuni renale moderate sau severe.

Folosirea in cursul sarcinii:

Studii pe animale de laborator nu au evideniat efecte teratogene. Totusi, NU exista date clare privind siguranta administrarii de Mupirocin unguent in cursul sarcinii. A nu se folosi decat cu recomandare medicala in cursul sarcinii sau alaptarii!

Reactii adverse:

Studiile clinice au relevat unele reactii adverse minore limitate la locul aplicarii, cum ar fi: senzatie de arsura, usturime si prurit.

Forma de prezentare:

Mupirocin unguent Tub melaminat.

Conditii de pastrare:

Se pastreaza la frigidere intre 2-8 grade Celsius. Dupa deschidere a se pastra la loc racoros (sub 25 grade Celsius) ferit de lumina. A nu se lasa la indemana copiilor. Unguentul ramas la sfarsitul perioadei de tratament, se arunca.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de a incepe sa utilizati Mupirocin unguent. Daca aveti nelamuriri sau daca aveti nevoie de mai multe informatii sau sfaturi, adresati-va medicului dumneavostra sau farmacistului.

Acest prospect este in scop informativ, produsul este preparat in Laboratorul Farmaciei Tei Rahova de catre specialisti in domeniul elaborarilor.