

RO I DROPsept este o soluție oftalmică, adjuvantă pentru protecția și repararea epitelului cornean și conjunctival, cu acțiune flogolitică.

Este indicat, la adulți și copii,

pentru tratamentul simptomelor precum senzație de

arsură, mâncărime, fotofobie,

senzație de corp străin și înroșire a ochilor asociate cu stări

inflamatorii în curs ale suprafeței oculare și organelor anexe, cum ar fi

conjunctivita, keratita, blefarita,

dacriocistita, meibomita și sindromul de ochi uscat.

DROPsept poate fi folosit de purtătorii de lentile de contact

INDICAȚII

DROPsept este indicat ca adjuvant:

- în profilaxia prechirurgicală
- în tratamentul infecțiilor conjunctivale
- în tratamentul infecțiilor corneene
- în tratamentul infecțiilor organelor anexe (marginile pleoapelor, canale lacrimale, gene)
- în tratamentul conjunctivitei
- în tratamentul keratitei
- în tratamentul dacriocistitei

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Deschideți flaconul și scoateți capacul de protecție;

2. Strângeți ușor flaconul și instilați 1/2 picături.

După utilizare închideți flaconul: conținutul rămas poate fi refolosit nu mai mult de 28

de zile după prima deschidere.

Poate fi utilizat de către purtătorii de lentile de contact.

COMPOZIȚIE

Vitamina E TPGS, Fosfat de sodiu dibazic, Fosfat de sodiu monobazic, Clorură de sodiu,

Digluconat de clorhexidină, Apă purificată.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII

- Produsul este destinat numai uzului oftalmic extern.
- Produsul poate fi folosit de un singur pacient.
- A nu se utiliza în caz de intoleranță sau hipersensibilitate cunoscută la componentele sale.

- Nu folosiți produsul dacă, la prima deschidere, observați că ambalajul este deteriorat sau nu este închis perfect.
 - Nu utilizați produsul după data de expirare indicată pe ambalaj.
 - Pe durata aplicării nu atingeți ochiul sau alte suprafețe cu vârful de dozare al flaconului.
 - Dacă în timpul utilizării apar efecte secundare, întrerupeți tratamentul și consultați un medic.
 - În cazuri rare au fost observate microcalcificări corneene la pacienții cu afecțiuni corneene anterioare și care sunt tratați cu preparate oftalmice ce conțin fosfați. În acest caz întrerupeți imediat tratamentul și adresați-vă medicului dumneavoastră;
 - Data de expirare se referă la produsul nedeschis și păstrat corect.
 - Înainte de utilizare citiți cu atenție instrucțiunile din prospect.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 - Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător după utilizare.
- Orice efecte nedorite pot fi semnalate Producătorului la adresa info@iromedgroup.com.
Semnalarea efectelor nedorite contribuie la siguranța dispozitivului.
Eventualele accidente grave trebuie semnalate Producătorului și Autorității competente din țara în care dispozitivul a fost utilizat.

CONȚINUT

1 flacon multidoză de 10 ml

MOD DE PĂSTRARE

După utilizare închideți flaconul: conținutul rămas poate fi refolosit nu mai mult de 28 de zile după prima deschidere.

DATA DE EXPIRARE

Cu ambalajul nedesfăcut, nu depășiți data de expirare indicată pe cutie și pe flacon.

Nu separați conținutul de ambalajul exterior și de prospect, pentru a avea toate informațiile necesare utilizării corecte